

# がん化学療法レジメン

対象患者

大腸がん

1サイクル期間 : 14日

レジメン名

FOLFIRI+BV療法

総サイクル数 : 病状進行まで

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	day2	day3	・・・	day14
1		パロノセトロン デキサメタゾン 生理食塩液	0.75mg 4.95mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	○				
2	○	ペバシズマブ 生理食塩液	5mg/kg 100mL	点滴静注	メイン	初回90分 2回目60分可 3回目以降30分可	○				
3		レボホリナート 5%ブドウ糖注射液	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	側管	2時間 イリノテカンと同時に	○				
4	○	イリノテカン 5%ブドウ糖注射液	150mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	メイン	2時間 レボホリナートと同時に	○				
5	○	5-FU 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	側管	15分	○				
6	○	5-FU 生理食塩液	2400mg/m <sup>2</sup> 全量130mL	持続静注	メイン	46時間	○ →				

- day1 : アブレヒタント125mg内服
- day2~3 : アブレヒタント80mg内服