

# がん化学療法レジメン

対象患者 大腸がん

1サイクル期間 : 14日

レジメン名 Maintenance療法 (FOLFOXIRI+BV)

総サイクル数 : 病状進行まで

| 通しNo. | 抗がん剤 | 薬品名・規格               | 投与量                              | 手技   | 投与ルート | 投与時間・速度 | day 1 | day 2 | day 3 | ・・・ | day 14 |
|-------|------|----------------------|----------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|--------|
| 1     |      | デキサメタゾン<br>生理食塩液     | 6.6mg<br>100mL                   | 点滴静注 | メイン   | 30分     | ○     |       |       |     |        |
| 2     | ○    | ペバシズマブ<br>生理食塩液      | 5mg/kg<br>100mL                  | 点滴静注 | メイン   | 30分     | ○     |       |       |     |        |
| 3     |      | レボホリナート<br>5%ブドウ糖注射液 | 200mg/m <sup>2</sup><br>250mL    | 点滴静注 | メイン   | 2時間     | ○     |       |       |     |        |
| 4     | ○    | 5-FU<br>生理食塩液        | 3200mg/m <sup>2</sup><br>全量130mL | 持続静注 | メイン   | 46時間    | ○     | →     |       |     |        |

備考