がん化学療法レジメン

対象患者	胃がん	
		1サイクル期間:1-7サイクル目 21日 / 8サイクル目以降 42日
 レジメン名	S-1+DTX療法【術後補助】	総サイクル数 : 手術後1年まで

通UNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	• • •	day14	• • •	day21	••• day28	••• day42
1		デキサメタゾン 生理食塩液	6.6mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	0						
		土埕長塩仪	TOOML										
2	0	ドセタキセル 5%ブドウ糖注射液	40mg/m² 250mL	点滴静注	メイン	60分	0						
		0%ノドソ橋注射液	250ML										
3		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	0						
4	0	S-1≪1-7サイクル≫	用量下記参照		経口	朝・夕食後	0—		\rightarrow				
		※1サイクル目はS-1内服のみ。ドセタキセルは2サイクル目から7サイクル目までの計6サイクル投与。1-7サイクルはS-1を朝夕食後に14日間連日投与し、その後7日間休薬する。							後7日間休薬する。				
※8サイクル目以降はS-1を朝夕食後に28日間連日投与し、その後14日間休薬する。これを1サイクルとし、手術1年後まで								きまで繰り	反す。				
5	0	S-1≪8サイクル以降≫	BSA < 1.25 m	n°∶80 mg/day	経口	朝•夕食後	0					<u></u>	
		1.25≦BSA<1.5 m ² : 100 mg/day									ľ		
			BSA≧1.5 m²	: 120 mg/day									

備考			
m 5			