

対象患者 未治療の全身性ALアミロイドーシス

1サイクル期間 : 28日

レジメン名 DCyBorD療法

総サイクル数 : 24サイクル

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	day2	...	day8	day9	...	day15	day16	...	day22	day23	...	day28
1 - 2 サイクル目																			
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服	経口	ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○	○		○	○		○	○		○	○		
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注	皮下	3-5分かけて投与	○			○			○			○			
3	○	ボルテソミブ 生理食塩液	1.3mg/m ² 1Vにつき1.2mLで溶解	皮下注	皮下		○			○			○			○			
4	○	シクロホスファミド	300mg/m ² (上限500mg/m ²)	内服	経口		○			○			○			○			

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	day2	...	day8	day9	...	day15	day16	...	day22	day23	...	day28
3 - 6 サイクル目																			
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服	経口	ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○	○		○	○		○	○		○	○		
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注	皮下	3-5分かけて投与	○						○						
3	○	ボルテソミブ 生理食塩液	1.3mg/m ² 1Vにつき1.2mLで溶解	皮下注	皮下		○			○			○			○			
4	○	シクロホスファミド	300mg/m ² (上限50mg/m ²)	内服	経口		○			○			○			○			

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	day28
7 - 24 サイクル目																			
1		デキサメタゾン	20mg/body	内服	経口	ダラツムマブ投与日は 投与1時間前に内服	○												
2	○	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下注	皮下	3-5分かけて投与	○												

備考

- ・ダラツムマブ投与日（全サイクル共通）：デキサメタゾン20mg、ジフェンヒドラミン50mg、アセトアミノフェン650～1000mgをダラツムマブ投与1時間前に内服
- ・1サイクル目 day1のみ：モンテルカスト10mg 内服
- ・1サイクル目：アシクロビル200mg/日 21日間連日経口投与（1サイクル目に帯状疱疹が発症しない場合、2サイクル目からは不要）