がん化学療法レジメン

| 対象患者 | 多発性骨髄腫 | 1サイクル期間 : 28日 |
|-------|-------------|---------------|
| レジメン名 | DPd療法【D皮下注】 | |

| 1 | | デキサメタゾン(75歳未満) | A.O. /NE | | 1 | ー 2 サイカ | _ | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|--|-------------|------|---|-----|--|
| 1 | | デキサメタバン (75歳夫法) | 10 /JE | | 1 - 2 サイクル目 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ノイッグラング (10)成不順) | 40mg/週 | 内服 | 経口 | ダラツムマブ投与日は | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | | 20mg | 20mg | | | |
| | | デキサメタゾン(75歳以上) | 20mg/週 | | | 投与1時間前に内服 | 20mg | | 20mg | | 20mg | | | 20mg | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | ダラツムマブ | 1800mg/body | 皮下注 | 皮下 | 3-5分かけて投与 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | \circ | ポマリドミド | 4mg/body | 内服 | 経口 | | 0- | | | | | | | > | | | | |
| | l | | | , 5510 | ,,,, | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | ダラツムマブ ポマリドミド | 1800mg/body 4mg/body | 皮下注内服 | 皮下経口 | 3-5分かけて投与 | O - | | 0 | | 0 | | | # | → · | · | → ○ | |

| 通しNo. | 抗がん剤 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | | | day2 · · · | day8 day9 | | day15 | day16 | • • • | day21 | day22 | day23 | • • • | day28 |
|-------|-------------|----------------|-------------|-----|-------|------------|------|------------|-----------|--|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 3 - 6 サイクル目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | デキサメタゾン(75歳未満) | 40mg/週 | 内服 | 経口 | ダラツムマブ投与日は | 20mg | 20mg | 40mg | | 20mg | 20mg | | | 40mg | | | |
| | | デキサメタゾン(75歳以上) | 20mg/週 | | | 投与1時間前に内服 | 20mg | | 20mg | | 20mg | | | | 20mg | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | ダラツムマブ | 1800mg/body | 皮下注 | 皮下 | 3-5分かけて投与 | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | ポマリドミド | 4mg/body | 内服 | 経口 | | 0- | | | | | | | → | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

| 通しNo. | 抗がん剤 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 投与時間•速度 | | day2 | · · · day8 | day9 | • • • da | y15 day | 6 | day21 | day22 | day23 | ••• | day28 |
|-------|-----------|----------------|-------------|----------|-------|------------|------|------|------------|------|----------|---------|---|----------|-------|-------|-----|-------|
| | 7 サイクル目以降 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | デキサメタゾン(75歳未満) | 40mg/週 | 内服 | 経口 | ダラツムマブ投与日は | 20mg | 20mg | 40mg | | 4 | Omg | | | 40mg | | | |
| | | デキサメタゾン(75歳以上) | 20mg/週 | | | 投与1時間前に内服 | 20mg | | 20mg | | 2 | Omg | | | 20mg | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | ダラツムマブ | 1800mg/body | 皮下注 | 皮下 | 3-5分かけて投与 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | \circ | ポマリドミド | 4mg/body | 内服 | 経口 | | 0- | | | | | | | - | | | | |
| | | /// // -/ | | אונוכ יו | ,,,,, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- ・ポマリドミド4mg/body day1~21内服(全サイクル共通、適宜減量) ・ダラツムマブ投与日(全サイクル共通):デキサメタゾン20mg、ジフェンヒドラミン50mg、アセトアミノフェン650~1000mgをダラツムマブ投与1時間前に内服
- ・1サイクル目 day1のみ:モンテルカスト10mg 内服
- ・1サイクル目:アシクロビル200mg/日 21日間連日経口投与(1サイクル目に帯状疱疹が発症しない場合、2サイクル目からは不要)