

# がん化学療法レジメン

対象患者 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

1サイクル : 21日

レジメン名 Pola+BR療法

総サイクル数 : 6サイクル

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	1サイクル目					2〜6サイクル目					
							day1	day2	day3	・・・	day21	day1	day2	・・・	day21		
1		イブuproフェン d-クロルフェニラミン	200mg 2mg	内服	経口	(初回のみ)	○										
2		ヒドロコルチゾン 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	全開	(初回のみ)	○										
3		アセトアミノフェン ジフェンヒドラミン プレドニゾン	650-1000mg 50-100mg 100mg	内服	経口			○					○				
4		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分		○					○				
5	○	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	メイン	※1	○						○				
6		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	30分							○				
7	○	ポラツズマブベドチン 注射用水 生理食塩液	1.8mg/m <sup>2</sup> 20mL (溶解用) 100mL	点滴静注	メイン	初回90分 2回目以降30分可		○					○				
8		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開		○					○				
9		グラニセトロン 生理食塩液	3mg 100mL	点滴静注	メイン	30分		○	○				○	○			
10	○	ベンダムスチン 生理食塩液	90mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	メイン	60分		○	○				○	○			
11		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○	○	○				○	○			

備考

※1：初回30分は50mg/mLで開始。有害事象に注意し、その後30分毎に50mg/hrずつ上げて、最大400mg/hrまでUP可。  
2回目以降、初回の副作用が軽微だった場合、100mg/hrから開始可で、その後30分毎に100mg/hrずつ上げて最大400mg/hrまでUP可。