

がん化学療法レジメン

対象患者

B細胞性急性リンパ性白血病

1～5サイクル目：42日

／

6～9サイクル目：84日

レジメン名

Blinatumomab療法【45kg以上/3→4】

総サイクル数

： 9サイクルまで

| 1サイクル目 |      |                                  |                                              |                                     |       |                       |    |            |     |            |     |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |       |
|--------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------|
| 通しNo.  | 抗がん剤 | 薬品名・規格                           | 投与量                                          | 手技                                  | 投与ルート | 投与時間・速度               | 備考 | day1       | ・・・ | day4       | ・・・ | day8       | ・・・ | day11       | ・・・ | day15      | ・・・ | day18       | ・・・ | day22      | ・・・ | day25       | ・・・ | day42 |
| 1      |      | デキサメタゾン<br>生理食塩液                 | 16.5mg<br>100mL                              | 点滴静注                                | メイン   | 30分                   |    | ○          |     |            |     | ○          |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |       |
| 2      | ○    | プリナツモマブ<br>安定化剤<br>注射用水<br>生理食塩液 | 9μg/body/日（45kg以上）<br>5.5mL<br>溶解用<br>270mL  | 点滴静注<br><br>1V：3mLで溶解<br>生食270mLにする | メイン   | 72時間（3日間）<br>3.3mL/hr |    | ○<br>2.5mL |     |            |     |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |       |
| 3      | ○    | プリナツモマブ<br>安定化剤<br>注射用水<br>生理食塩液 | 9μg/body/日（45kg以上）<br>5.5mL<br>溶解用<br>270mL  | 点滴静注<br><br>1V：3mLで溶解<br>生食270mLにする | メイン   | 96時間（4日間）<br>2.5mL/hr |    |            |     | ○<br>3.3mL |     |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |       |
| 4      | ○    | プリナツモマブ<br>安定化剤<br>注射用水<br>生理食塩液 | 28μg/body/日（45kg以上）<br>5.5mL<br>溶解用<br>270mL | 点滴静注<br><br>1V：3mLで溶解<br>生食270mLにする | メイン   | 72時間（3日間）<br>3.3mL/hr |    |            |     |            |     | ○<br>8.0mL |     |             |     | ○<br>8.0mL |     |             |     | ○<br>8.0mL |     |             |     |       |
| 5      | ○    | プリナツモマブ<br>安定化剤<br>注射用水<br>生理食塩液 | 28μg/body/日（45kg以上）<br>5.5mL<br>溶解用<br>270mL | 点滴静注<br><br>1V：3mLで溶解<br>生食270mLにする | メイン   | 96時間（4日間）<br>2.5mL/hr |    |            |     |            |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |       |

がん化学療法レジメン

対象患者

B細胞性急性リンパ性白血病

1～5サイクル目：42日

／

6～9サイクル目：84日

レジメン名

Blinatumomab療法【45kg以上/3→4】

総サイクル数

： 9サイクルまで

| 2 - 5 サイクル目 |      |                                  |                                              |                                     |       |                       |    |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |       |
|-------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|----|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------|
| 通しNo.       | 抗がん剤 | 薬品名・規格                           | 投与量                                          | 手技                                  | 投与ルート | 投与時間・速度               | 備考 | day1       | ・・・ | day4        | ・・・ | day8       | ・・・ | day11       | ・・・ | day15      | ・・・ | day18       | ・・・ | day22      | ・・・ | day25       | ・・・ | day42 |
| 6           |      | デキサメタゾン<br>生理食塩液                 | 16.5mg<br>100mL                              | 点滴静注                                | メイン   | 30分                   |    | ○          |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |       |
| 7           | ○    | プリナツモマブ<br>安定化剤<br>注射用水<br>生理食塩液 | 28μg/body/日（45kg以上）<br>5.5mL<br>溶解用<br>270mL | 点滴静注<br><br>1V：3mLで溶解<br>生食270mLにする | メイン   | 72時間（3日間）<br>3.3mL/hr |    | ○<br>8.0mL |     |             |     | ○<br>8.0mL |     |             |     | ○<br>8.0mL |     |             |     | ○<br>8.0mL |     |             |     |       |
| 8           | ○    | プリナツモマブ<br>安定化剤<br>注射用水<br>生理食塩液 | 28μg/body/日（45kg以上）<br>5.5mL<br>溶解用<br>270mL | 点滴静注<br><br>1V：3mLで溶解<br>生食270mLにする | メイン   | 96時間（4日間）<br>2.5mL/hr |    |            |     | ○<br>10.7mL |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |       |
| 6 - 9 サイクル目 |      |                                  |                                              |                                     |       |                       |    |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |       |
| 通しNo.       | 抗がん剤 | 薬品名・規格                           | 投与量                                          | 手技                                  | 投与ルート | 投与時間・速度               | 備考 | day1       | ・・・ | day4        | ・・・ | day8       | ・・・ | day11       | ・・・ | day15      | ・・・ | day18       | ・・・ | day22      | ・・・ | day25       | ・・・ | day84 |
| 9           |      | デキサメタゾン<br>生理食塩液                 | 16.5mg<br>100mL                              | 点滴静注                                | メイン   | 30分                   |    | ○          |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |            |     |             |     |       |
| 10          | ○    | プリナツモマブ<br>安定化剤<br>注射用水<br>生理食塩液 | 28μg/body/日（45kg以上）<br>5.5mL<br>溶解用<br>270mL | 点滴静注<br><br>1V：3mLで溶解<br>生食270mLにする | メイン   | 72時間（3日間）<br>3.3mL/hr |    | ○<br>8.0mL |     |             |     | ○<br>8.0mL |     |             |     | ○<br>8.0mL |     |             |     | ○<br>8.0mL |     |             |     |       |
| 11          | ○    | プリナツモマブ<br>安定化剤<br>注射用水<br>生理食塩液 | 28μg/body/日（45kg以上）<br>5.5mL<br>溶解用<br>270mL | 点滴静注<br><br>1V：3mLで溶解<br>生食270mLにする | メイン   | 96時間（4日間）<br>2.5mL/hr |    |            |     | ○<br>10.7mL |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |            |     | ○<br>10.7mL |     |       |