

# がん化学療法レジメン

対象患者

子宮頸がん

1サイクル期間 : 21日

レジメン名 CBDCA+PAC+BV療法【子宮頸癌再発】

総サイクル数 : 病状進行まで

通しNo.	抗がん剤	薬品名・規格	投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	day 1	・・・	day21
1		デキサメタゾン パロノセトロン ファモチジン 生理食塩液	19.8mg 0.75mg 20mg 100mL	点滴静注	メイン	30分	○		
2		生理食塩液	100mL	点滴静注	メイン	30分	○		
3	○	パクリタキセル 生理食塩液	175mg/m <sup>2</sup> 500mL	点滴静注	メイン	3時間	○		
4	○	カルボプラチン 5%ブドウ糖注射液	AUC 6 250mL	点滴静注	メイン	1時間	○		
5		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○		
6	○	ペバシズマブ 生理食塩液	15mg/kg 100mL	点滴静注	メイン	初回90分 2回目60分 3回目以降30分可	○		
7		生理食塩液	50mL	点滴静注	メイン	全開	○		

備考

- day1 : アプレピタント125mg内服
- day2~3 : アプレピタント80mg内服
- シフェンヒドラミン50mgをパクリタキセル投与30分前までに内服