

がん化学療法レジメン

対象患者

卵巣がん

1サイクル期間 : 21日

レジメン名

dose dense TC療法【卵巣がん】

総サイクル数 : 6サイクル(最大9サイクル)

| 通しNo. | 抗がん剤 | 薬品名・規格 | 投与量 | 手技 | 投与ルート | 投与時間・速度 | day1 | ・・・ | day8 | ・・・ | day15 | ・・・ | day21 |
|-------|------|---------------------------------------|----------------------------------|------|-------|---------|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| 1 | | パロノセトロン デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液 | 0.75mg 6.6mg 20mg 100mL | 点滴静注 | メイン | 30分 | ○ | | | | | | |
| 2 | | デキサメタゾン ファモチジン 生理食塩液 | 6.6mg 20mg 100mL | 点滴静注 | メイン | 30分 | | | ○ | | ○ | | |
| 3 | | 生理食塩液 | 100mL | 点滴静注 | メイン | 30分 | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 4 | ○ | パクリタキセル 生理食塩液 | 80mg/m ² 250mL | 点滴静注 | メイン | 60分 | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 5 | ○ | カルボプラチン 5%ブドウ糖注射液 | AUC 6 250mL | 点滴静注 | メイン | 60分 | ○ | | | | | | |
| 6 | | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | メイン | 全開 | ○ | | ○ | | ○ | | |

備考

- ・ジフェンヒドラミン50mgをパクリタキセル投与30分前までに内服
- ・day1 : アブレピタント125mg内服
- ・day2~3 : アブレピタント80mg内服